

ACENTOZELL® 32 SC

TEBUCONAZOL + AZOXISTROBINA 32 SC

ACENTOZELL® 32 SC es un fungicida sistémico, compuesto por dos ingredientes activos: Tebuconazol y azoxiestrobina. Su mecanismo de acción se basa en la acción combinada de ambos principios activos. Tebuconazol pertenece al grupo químico de los triazoles, cuyo modo de acción es inhibir la biosíntesis del ergosterol mediante el bloqueo de la C14 dimetilasa provocando la acumulación de esterol tóxico a la célula. Azoxiestrobina pertenece al grupo de las estrobirulinas, cuyo modo de acción se efectúa inhibiendo la respiración mitocondrial de los hongos, a través del bloqueo de la transferencia de electrones entre el citocromo B y el citocromo C1. Ambos ingredientes activos juntos generan varias reacciones en cadena que desembocan en un desequilibrio enzimático que detiene el crecimiento del micelio del hongo, así como la producción y germinación de las esporas.

CULTIVOS Y PRESENTACIONES COMERCIALES:

- **COLOMBIA:** Arroz, Rosa
 - **Envase:** 100mL, 250mL, 500mL, 1L, 5L, 10L, 20L, 25L, 200L.
- **PERÚ:** Espárrago
 - **Envase:** 100mL, 250mL, 500mL, 1L, 5L, 10L, 20L, 25L, 200L.
- **COSTA RICA:** Rosa
 - **Envase:** 100mL, 250mL, 500mL, 1L, 5L, 10L, 20L, 25L, 200L.
- **EL SALVADOR:** Café, Cebolla, Frijol, Maíz, Papa, Tomate
 - **Envase:** 250mL, 500mL, 1L, 5L, 10L, 20L.
- **GUATEMALA:** Ajo, Arveja China, Berenjena, Cebollino, Chile, Lentejas, Puerro, Soya, Tabaco
 - **Envase:** 100mL, 250mL, 500mL, 1L, 5L, 10L, 20L, 25L, 200L.
- **HONDURAS:** Café, Cebolla, Frijol, Maíz, Papa, Tomate
 - **Envase:** 100mL, 250mL, 500mL, 1L, 5L, 10L, 20L, 25L, 200L.
- **NICARAGUA:** Arroz, Mani
 - **Envase:** 100mL, 250mL, 500mL, 1L, 5L, 10L, 20L, 25L, 200L.
- **PANAMÁ:** Café, Cebolla, Frijol, Maíz, Papa, Tomate
 - **Envase:** 250mL, 500mL, 1L, 5L, 20L.
- **REPÚBLICA DOMINICANA:** Ajo, Café, Cebolla, Cebolleta, Cebollino, Frijol, Mango, Maíz, Papa, Papaya, Pimiento, Puerro, Soya, Tomate
 - **Envase:** 100mL, 250mL, 500mL, 1L, 5L, 10L, 20L, 25L.

COLOMBIA

Cultivo	Plaga	Dosis y época de aplicación
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Añublo de la vaina (<i>Thanatophorus cucumeris</i> ; <i>sin.: Rhizoctonia solani</i>)	0,8 - 1,2 L/ha (En 200 L de mezcla/ha) Agite vigorosamente el envase antes de agregarlo al tanque de mezcla
Rosa (<i>Rosa sp</i>)	Mildeo polvoso (<i>Podosphaera pannosa</i> ; <i>sin.: Sphaerotheca pannosa</i>)	0,8 - 1,2 L/ha (En 1000-2000 L de mezcla/ha) Agite vigorosamente el envase antes de agregarlo al tanque de mezcla

PERÚ

Cultivo	Plaga	Dosis
Espárrago	Mancha del peral (<i>Stemphylium vesicarium</i>)	0.1-0.2 L / 200 L

NICARAGUA

Cultivo	Plaga	Dosis y época de aplicación
Arroz <i>Oryza sativa</i> Maní <i>Arachis hypogaea</i>	<i>Puccinia arachidis</i> <i>Cercospora arachidicola</i> <i>Sclerotium rolfsii</i> <i>Pyricularia oryzae</i> <i>Helminthosporium spp.</i> <i>Leptosphaerulina crassiasca</i> <i>Rhizoctonia solani</i>	0.5 L/ha (0.35 L/mz) Volumen de caldo: 180-400 L/ha (126-280 L/mz) Momento de aplicación: cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición del hongo o cuando se observen los

PANAMÁ, EL SALVADOR, HONDURAS Y GUATEMALA

Cultivo	Plaga	Dosis y época de aplicación
Café <i>Coffea Arabica</i>	Roya del Cafeto <i>Hemileia vastatrix</i>	0.7 – 1.5 L/ha (0.49 – 1.05 L/mz) Volumen de caldo: 400 L/ha (280 L/mz) Momento de aplicación: cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición del hongo o cuando se observen los primeros síntomas.
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Mancha Púrpura <i>Alternaria porri</i>	0.3 – 0.7 L/ha (0.21 – 0.49 L/mz) Volumen de caldo: 400 L/ha (280 L/mz) Momento de aplicación: cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición del hongo o cuando se observen los primeros síntomas.
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum sp.</i>	0.3 – 0.5 L/ha (0.21 – 0.35 L/mz) Volumen de caldo: 400 L/ha (280 L/mz) Momento de aplicación: cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición del hongo o cuando se observen los primeros síntomas.
Maíz <i>Zea mays</i>	Mancha de Asfalto <i>Phyllachora maydis</i> <i>Monographella maydis</i> <i>Coniothyrium phyllachorae</i>	0.5 – 1.0 L/ha (0.35 – 0.7 L/mz) Volumen de caldo: 180 L/ha (126 L/mz) Momento de aplicación: justo antes floración.
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón Temprano <i>Alternaria solani</i>	0.3 – 0.6 L/ha (0.21 – 0.42 L/mz) Volumen de caldo: 400 L/ha (280 L/mz) Momento de aplicación: cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición del hongo o cuando se observen los primeros síntomas.
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Tizón Temprano <i>Alternaria solani</i>	0.3 – 0.6 L/ha (0.21 – 0.42 L/mz) Volumen de caldo: 300 L/ha (210 L/mz) Momento de aplicación: cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición del hongo o cuando se observen los primeros síntomas.

COSTA RICA

Cultivo	Plaga	Dosis y época de aplicación
Rosa (Rosa sp)	Mildeo polvoso (Sphaerotheca pannosa)	0.8 – 1.2 ml/L En un volumen de agua de 10 L/cama de producción

GUATEMALA

Cultivo	Plaga	Dosis y época de aplicación
Ajo <i>Allium sativum</i> Puerro <i>Allium ampeloprasum</i> var. <i>porrum</i> Cebollín <i>Allium fistulosum</i>	Mancha Púrpura <i>Alternaria porri</i>	0.3 – 0.7 L/ha (0.21 – 0.49 L/mz) Volumen de caldo: 400 L/ha (280 L/mz) Momento de aplicación: cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición del hongo o cuando se observen los primeros síntomas
Arveja china <i>Pisum sativum</i> Soya <i>Glycine max</i> Lenteja <i>Lens culinaris</i>	Antracnosis <i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	0.3 – 0.5 L/ha (0.21 – 0.35 L/mz) Volumen de caldo: 400 L/ha (280 L/mz) Momento de aplicación: cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición del hongo o cuando se observen los primeros síntomas.
Chile <i>Capsicum annuum</i> Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i> Berenjena <i>Solanum melongena</i>	Tizón Temprano <i>Alternaria solani</i>	0.3 – 0.6 L/ha (0.21 – 0.42 L/mz) Volumen de caldo: 300 L/ha (210 L/mz) Momento de aplicación: cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición del hongo o cuando se observen los primeros síntomas.

REPÚBLICA DOMINICANA

Cultivo	Plaga	Dosis
Café (<i>Coffea arabica</i>)	Roya del Cafeto (<i>Hemileia vastatrix</i>)	0.7 – 1.5 L/ha (0.49 – 1.05 L/mz) En solución final de 400 L/ha (280 L/mz)
Cebolla (<i>Allium cepa</i>) Cebolleta (<i>Allium fistulosum</i>) Cebollino (<i>Allium schoenoprasum</i>) Ajo (<i>Allium sativum</i>) Puerro (<i>Allium ampeloprasum</i>)	Mancha Púrpura (<i>Alternaria porri</i>)	0.3 – 0.7 L/ha (0.21 – 0.49 L/mz) En solución final de 400 L/ha (280 L/mz)
Frijol (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	Antracnosis (<i>Colletotrichum spp.</i>)	0.3 – 0.5 L/ha (0.21 – 0.35 L/mz) En solución final de 400 L/ha (280 L/mz)
Mango (<i>Mangifera indica</i>)		0.5 L/ha (0.35 L/mz)
Papaya (<i>Carica papaya</i>)		0.4 – 0.6 L/ha (0.28 – 0.42 L/mz) En solución final de 650 – 890 L/ha (454 – 622 L/mz)
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Mancha de Asfalto (<i>Phyllachora maydis</i> y los hongos asociados <i>Monographella maydis</i> y <i>Coniothyrium phyllachorae</i>)	0.5 – 1.0 L/ha (0.35 – 0.7 L/mz) En solución final de 180 L/ha (126 L/mz)
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Tizón Temprano (<i>Alternaria solani</i>)	0.3 – 0.6 L/ha (0.21 – 0.42 L/mz) En solución final de 400 L/ha (280 L/mz)
Soya (<i>Glycine max</i>)		0.5 L/ha (0.35 L/mz)
Pimiento (<i>Capsicum annuum</i>)		0.8 L/ha (0.56 L/mz) En solución final de 600 L/ha (420 L/mz)
Tomate (<i>Solanum lycopersicum</i>)		0.3 – 0.6 L/ha (0.21 – 0.42 L/mz) En solución final de 300 L/ha (210 L/mz)

CONTACTO ZELLAG

 +34 96 186 21 20
 info@zellag.com
 Marines, Valencia (España)

 +41 61 534 71 30
 info@zellag.com
 4125 Riehen (Switzerland)

2021 © Zellag AG. Todos los derechos reservados.

Exención de responsabilidad: La información contenida en este documento es a título comercial y orientativo. Solicite la ficha técnica de su país para una información precisa de uso, manipulación y aplicación. Zellag AG no se responsabiliza de ningún daño causado por el uso de la información contenida en este documento.

ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, marca registrada. Documento y versión: **FTC-ACENTOZELL 32 SC V.22.1**

www.zellag.com