

ACROZELL® 69 WP

MANCOZEB + DIMETOMORF 69 WP

ACROZELL® 69 WP está compuesto por dos ingredientes activos el dimetomorf y mancozeb. Dimetomorf: tiene propiedades sistémicas, actividad preventiva y curativa y excelente acción antiesporulante. Actúa bloqueando todas las fases que intervienen en la formación de la membrana celular, tales como la germinación de las esporas, la formación del tubo germinativo y de los haustorios, el crecimiento de las hifas y la formación de las oosporas. Mancozeb: tiene efecto preventivo, por contacto. Es de amplio espectro. Su mecanismo de acción multisitio induce inhibición enzimática múltiple, afecta a la respiración celular, inactiva grupos sulfidrilos (-SH) y afecta la síntesis de lípidos de la membrana. La molécula de este fungicida libera gradualmente un gas denominado etileno diisotiocianato, que es el principio que actúa sobre los hongos, el que forma un halo de inhibición varias veces mayor al área cubierta por depósito de partículas, que impide la germinación de las esporas e inhibe el desarrollo del tubo germinativo del hongo.

CULTIVOS Y PRESENTACIONES COMERCIALES:

- **República Dominicana:** Ajo, Ají, Cebolla, Melón, Papa, Sandía, Tabaco, Tomate
 - **Envases:** 50 gr, 250 gr, 500 gr, 750 gr, 1 kg, 25 kg
- **Guatemala:** Ajo, Ají, Cebolla, Melón, Papa, Sandía, Tabaco, Tomate
 - **Envases:** 250 gr, 500 gr, 750 gr, 1 kg, 25 kg
- **Honduras:** Ajo, Ají, Cebolla, Melón, Papa, Pepino, Sandía, Tabaco, Tomate
 - **Envases:** 50 gr, 250 gr, 500 gr, 750 gr, 1 kg, 2 kg, 25 kg
- **Nicaragua:** Cebolla, Chiltoma, Papa, Tabaco
 - **Envases:** 50 gr, 250 gr, 500 gr, 750 gr, 1 kg, 25 kg
- **Panamá:** Ajo, Ají, Papa, Tabaco, Tomate
 - **Envases:** 50 gr, 250 gr, 500 gr, 750 gr, 1 kg, 2 kg, 25 kg
- **Perú:** Papa
 - **Envases:** 50 gr, 250 gr, 500 gr, 750 gr, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 25 kg

PERÚ

Cultivo	Plaga	Dosis y época de aplicación
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Rancha o Hielo <i>Phytophthora infestans</i>	1.5-2.5 kg/ha Momento de aplicación: Aplicar ACROZELL 69 WP en etapa de desarrollo vegetativo del cultivo, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad y el nivel de infestación sea bajo. Realizar como máximo 02 aplicaciones por campaña considerando una campaña al año para el cultivo de papa.

REPÚBLICA DOMINICANA

Cultivo	Plaga	Dosis	Recomendaciones
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>) Tomate (<i>Lycopersicum esculentum</i>)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.5–2.0 kg/ha (1.0-1.4 kg/mz)	En aplicaciones dirigidas a las hileras, en los primeros estados del desarrollo del cultivo, usar el producto en dosis de 300 - 400 g/100 L de agua cubriendo totalmente las plantas (usar mochila de espalda sin motor). Usar las dosis indicadas por hectárea, una vez que el cultivo se encuentre completamente desarrollado.
Melón (<i>Cucumis melo</i>) Sandía (<i>Citrullus vulgaris</i>)	Mildiu veloso (<i>Peronospora cubensis</i>)	750 gramos de producto comercial/200L de agua, utilizando como mínimo 400 L de agua por hectárea.	
Ajo (<i>Allium sativum</i>) Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	Mildiu (<i>Peronospora destructor</i>) Mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>)	1.5–2.0 Kg/ha (1.0-1.4 Kg/mz)	
Ají (<i>Capsicum annuum</i>)	Marchitez (<i>Phytophthora capsici</i>)	1.5–2.0 Kg/ha (1.0-1.4 Kg/mz)	Efectuar 2 ó 3 aplicaciones durante el período de mayor susceptibilidad del cultivo.
Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)	Moho azul (<i>Peronospora tabacina</i>)	0.75 Kg/ha (0.5 Kg/mz)	25% crecimiento de la planta (primeras 2 semanas después del trasplante). 120 L de agua/ha.
		1.50 Kg/ha (1.0 Kg/mz)	50% crecimiento de la planta (semanas 3 a 7 después del trasplante). 240 de agua L/ha.
		2.25 Kg/ha (1.6 Kg/mz)	75% crecimiento de la planta (semanas 7 a 10 después del trasplante). 360 de agua L/ha.
		3.00 Kg/ha (2 Kg/mz)	100% crecimiento de la planta (semanas >10 después del trasplante). 480 de agua L/ha.

NICARAGUA

Cultivo	Plaga	Dosis	Recomendaciones
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>)	Moho azul <i>Peronospora tabacina</i>	1.5–2.0 kg/ha (1.05-1.4 kg/mz)	Momento de aplicación: cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición del hongo o cuando se observen los primeros síntomas.
Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)	Tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i>	Volumen de caldo: 200-500 L/ha (140-350 L/mz)	En los primeros estados del desarrollo del cultivo, usar el producto en dosis de 300 - 400 g/100 L de agua cubriendo totalmente las plantas, con un volumen de mezcla de 120, 240, 360 L/ha, (84, 168, 152 L/mz) según haya completado, respectivamente, el 25, 50 y 75% del crecimiento total de la planta.
Chiltoma (<i>Capsicum annuum</i>)	Marchitez <i>Phytophthora capsici</i>		
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)			

GUATEMALA (I) - HONDURAS (I) - PANAMÁ

Cultivo	Plaga	Dosis	Recomendaciones
Papa (<i>Solanum tuberosum</i>) Tomate (<i>Lycopersicum esculentum</i>)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.5–2.0 kg/ha (1.0-1.4 kg/mz)	Aplicar de forma profiláctica o preventiva En aplicaciones dirigidas a las hileras, en los primeros estados del desarrollo del cultivo, usar el producto en dosis de 300 - 400 g/100 L de agua cubriendo totalmente las plantas .
Ajo (<i>Allium sativum</i>) Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	Mildiu (<i>Peronospora destructor</i>) Mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>)	Volumen de caldo: 200-400 L/ha (140-280 L/mz)	
Ají (<i>Capsicum annuum</i>)	Marchitez (<i>Phytophthora capsici</i>)	Momento de aplicación: cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición del hongo o cuando se observen los primeros síntomas.	Efectuar 2 ó 3 aplicaciones durante el período de mayor susceptibilidad del cultivo.
Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)	Moho azul (<i>Peronospora tabacina</i>)	0.75 kg/ha (0.50 kg/mz)	Momento de aplicación: en las primeras 2 semanas después del trasplante.
		Volumen de caldo: 120 L/ha (83.9 L/mz)	
		1.5 kg/ha (1.05 kg/mz)	Momento de aplicación: de 3 a 7 semanas después del trasplante.
		Volumen de caldo: 240 L/ha (167.8 L/ha)	
		2.25 kg/ha (1.6 kg/mz)	Momento de aplicación: de 7 a 10 semanas después del trasplante.
		Volumen de caldo: 360 L/ha (251.75 L/mz)	
		3 kg/ha (2.0 kg/mz)	Momento de aplicación: más de 10 semanas después del trasplante.
		Volumen de caldo: 480 L/ha (335.66 L/mz)	

GUATEMALA (II)

Cultivo	Plaga	Dosis	Recomendaciones
Melón <i>(Cucumis melo)</i> Sandía <i>(Citrullus lanatus)</i>	Mildiu vellosa <i>(Pseudoperonospora cubensis)</i>	750 g/200 L de agua. Volumen de caldo: utilizar como mínimo 400 L/ha (280 L/mz)	Momento de aplicación: cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición del hongo o cuando se observen los primeros síntomas. Aplicar de forma profiláctica o preventiva En aplicaciones dirigidas a las hileras, en los primeros estados del desarrollo del cultivo, usar el producto en dosis de 300 - 400 g/100 L de agua cubriendo totalmente las plantas.

HONDURAS (II)

Cultivo	Plaga	Dosis	Recomendaciones
Melón <i>(Cucumis melo)</i> Sandía <i>(Citrullus lanatus)</i> Pepino <i>(Cucumis sativus)</i>	Mildiu <i>(Peronospora destructor)</i> Tizón <i>(Alternaria cucumerina)</i>	1.5-2.0 kg/ha (1.05-1.4 kg/mz) Volumen de caldo: 200-400 L/ha (140-280 L/mz)	Momento de aplicación: cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición del hongo o cuando se observen los primeros síntomas. Aplicar de forma profiláctica o preventiva En aplicaciones dirigidas a las hileras, en los primeros estados del desarrollo del cultivo, usar el producto en dosis de 300 - 400 g/100 L de agua cubriendo totalmente las plantas.

CONTACTO ZELLAG

 +34 96 186 21 20
 info@zellag.com
 Marines, Valencia (España)

 +41 61 534 71 30
 info@zellag.com
 4125 Riehen (Switzerland)

2021 © Zellag AG. Todos los derechos reservados.

Exención de responsabilidad: La información contenida en este documento es a título comercial y orientativo. Solicite la ficha técnica de su país para una información precisa de uso, manipulación y aplicación. Zellag AG no se responsabiliza de ningún daño causado por el uso de la información contenida en este documento.

ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, marca registrada. Documento y versión: **FTC-ACROZELL 69 WP V.22.1**