

CARACOZELL® 6 GB**METALDEHIDO 6 GB**

CARACOZELL® 6 GB actúa por contacto e ingestión. El metaldehído influye negativamente en los procesos en los que interviene la ATPasa para la producción de energía metabólica y la serotonina que controla la producción y la excreción de las mucosas. Rompe las paredes de las células productoras de mucus con lo que induce a una secreción creciente de moco y produce una degradación importante de las membranas y mitocondrias de los tejidos productores de moco, causando contracciones musculares, parálisis, deshidratación y muerte.

CULTIVOS Y PRESENTACIONES COMERCIALES:

- **Ecuador:** Arroz
 - **El Salvador:** Frijol
 - **Guatemala:** Frijol, soya, arveja, haba
 - **Honduras:** Ajo, café, chile/ají, lechuga, melón, repollo, tomate, frijol, tabaco,
 - **Panamá:** Frijol
-
- **Presentaciones para todos los países:** 400 gr, 1 Kg, 25 Kg

EL SALVADOR Y PANAMÁ

Cultivo	Plaga	Dosis y época de aplicación
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	Babosa del frijol <i>Sarasinula plebeia</i>	6,4-10 kg/ha (4,5-7 kg/mz) Momento de aplicación: al ver las primeras babosas o caracoles o al observar los primeros síntomas de ataque.

HONDURAS

Cultivo	Plaga	Dosis y época de aplicación
Ajo <i>Allium sativum</i> Café <i>Coffea arabica</i>	Caracol de las huertas <i>Cepaea hortensis</i> Babosa gris del campo <i>Deroceras agreste</i> Babosa del frijol <i>Sarasinula plebeia</i> Caracol manchado <i>Helix sp.</i>	6,4-10 kg/ha (4,5-7 kg/mz)
Chile/Ají <i>Capsicum spp.</i> Lechuga <i>Lactuca sativa</i> Melón <i>Cucumis melo</i> Repollo <i>Brassica oleracea</i> <i>var. capitata</i> Tomate <i>Solanum</i> <i>lycopersicum</i>	Caracol de las huertas <i>Cepaea hortensis</i>	
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	Babosa de vientre blanco <i>Arion fasciatus</i> Babosa oscura <i>Arion subfuscus</i> Babosa gris del campo <i>Deroceras agreste</i> Caracol manchado <i>Helix spp.</i> Babosa del frijol <i>Sarasinula plebeia</i> Caracolillo <i>Zonitoides arboreus</i>	Momento de aplicación: al ver las primeras babosas o caracoles o al observar los primeros síntomas de ataque.
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	Babosa de vientre blanco <i>Arion fasciatus</i> Babosa oscura <i>Arion subfuscus</i> Babosa gris del campo <i>Deroceras agreste</i> Caracol manchado <i>Helix aspersa</i> Caracol de las huertas <i>Cepaea hortensis</i> Caracolillo <i>Zonitoides arboreus</i>	

GUATEMALA

Cultivo	Plaga	Dosis y época de aplicación
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i> Soya, soja <i>Glycine max</i> Arveja <i>Pisum sativum</i> Haba <i>Vicia faba</i>	Babosa del frijol <i>Sarasinula plebeia</i>	6,4-10 kg/ha (4,5-7 kg/mz) Momento de aplicación: al ver las primeras babosas o caracoles o al observar los primeros síntomas de ataque.

ECUADOR

Cultivo	Plaga	Dosis y
Arroz <i>(Oryza sativa)</i>	Caracol manzana <i>(Pomacea canaliculata)</i>	3.00 kg/ha

CONTACTO ZELLAG

 +34 96 186 21 20
 info@zellag.com
 Marines, Valencia (España)

 +41 61 534 71 30
 info@zellag.com
 4125 Riehen (Switzerland)

2021 © Zellag AG. Todos los derechos reservados.

Exención de responsabilidad: La información contenida en este documento es a título comercial y orientativo. Solicite la ficha técnica de su país para una información precisa de uso, manipulación y aplicación. Zellag AG no se responsabiliza de ningún daño causado por el uso de la información contenida en este documento.

ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, marca registrada. Documento y versión: **FTC-CARACOZELL 6 GB V.22.1**