

K-MIX-COMBI®

EL ENGORDADOR

1. COMPUESTO:

K-MIX-COMBI, es un fertilizante granular soluble alto en Potasio y Fosforo, Azufre, Magnesio, Boro y Hormonas, que sirven para estimular el crecimiento de las plantas, es diseñado para ser aplicado durante la formación y desarrollo del fruto.

2. COMPOSICIÓN:

ELEMENTO	% p/p
Fosforo (P ₂ O ₅)	20.00
Potasio (K ₂ O)	52.00
Azufre (S) 800 ppm	0.08
Magnesio (MgO) 1000 ppm	0.10
Boro (B) 100 ppm	0.01
Ácidos Húmicos	2.50
Inertes	25.31
Total	100.00

3. ACCIÓN BIOLÓGICA:

Fertilizante granular totalmente soluble con altas concentraciones de Potasio y Fósforo, contiene los elementos NIR, (Resistencia Natural Inducida), estos elementos juegan un papel importante para que la planta resista situaciones adversas, previniendo el ataque de hongos patógenos, **K-Mix-Combi**.

Proporciona excelentes resultados cuando se aplica después de la floración y durante la formación de frutos, semillas y tubérculos mejorando el tamaño, peso, uniformidad y calidad de frutos.

4. APLICACIÓN Y COMPATIBILIDAD:

Se aplica directamente sobre el follaje del cultivo con cualquier equipo convencional, pueden hacerse aplicaciones a través de sistemas de riego por goteo. Es compatible con los fitosanitarios de uso común en los cultivos en que se recomienda.

5. DOSIS Y CULTIVOS RECOMENDADOS:

Preparación de la mezcla:

Llenar con agua hasta la mitad de un tanque de aplicación (capacidad 200 litros).
Diluir el contenido de este producto y luego completar con agua.

Forma de aplicación: Foliar.

CULTIVOS	NOMBRE CIENTIFICO	DOSIS Kg/Mz	DOSIS Kg/Ha	EPOCA DE APLICACIÓN
Café	<i>Coffea arabica</i>	0.7 – 1.4	1.0 – 2.0	Antes – después de llenado de floración y llenado de granos.
Maní	<i>Arachis hypogaea</i>	0.7 – 1.4	1.0 – 2.0	Durante llenado de vainas.
Arroz	<i>Oryza sativa</i>	0.7 – 1.1	1.0 – 1.5	Durante embuchamiento y llenado de granos.
Frijol	<i>Phaseolus vulgaris</i>	0.7 – 1.1	1.0 – 1.5	Durante la formación de vainas 40-45 días después de germinación.
Tomate	<i>Solanum lycopersicum</i>	0.7 – 1.1	1.0 – 1.5	Inicio de la formación de fruto hasta la maduración.
Papa	<i>Solanum tuberosum</i>	0.7 – 1.4	1.0 - 2.0	Inicio de la formación de fruto hasta la maduración.
Cebolla	<i>Allium cepa</i>	0.7 – 1.1	1.0 – 1.5	Inicio de la formación de fruto hasta la maduración.
Sandía	<i>Citrullus lanatus</i>	0.7 – 1.1	1.0 – 1.5	Cuatro aplicaciones en el ciclo; 20,35, 45 y 60 días después de germinación.
Melón	<i>Cucumis melo</i>	0.7 – 1.1	1.0 – 1.5	Cuatro aplicaciones en el ciclo; 20,35, 45 y 60 días después de germinación.
Crucíferas	<i>Brassica sp.</i>	0.7 – 1.1	1.0 – 1.5	Tres aplicaciones en el ciclo: 35, 45 y 60 días después de germinación.
Tabaco	<i>Nicotiana tabacum</i>	0.7 – 1.1	1.0 – 1.5	Cuatro aplicaciones en el ciclo; 20,35, 45 y 60 días después de germinación.
Camote	<i>Ipomea batatas</i>	0.7 – 1.4	1.0 – 2.0	Inicio de la formación de fruto hasta la maduración.
Chile	<i>Capsicum annum</i>	0.7 – 1.1	1.0 – 1.5	Inicio de la formación de fruto hasta la maduración.
Banano	<i>Musa paradisiaca</i>	0.7 – 1.4	1.0 – 2.0	Después de la floración y durante la formación del fruto.
Okra	<i>Abelmoschus esculentus</i>	0.7 – 1.1	1.0 – 1.5	Después de la floración y durante la formación del fruto.
Caña de Azúcar	<i>Saccharum officinarum</i>	0.7 – 1.4	1.0 – 2.0	Después de la floración y durante la formación del fruto.