



Centros Nacionales de Intoxicación. En caso de intoxicación, llamar a:

País	Institución	Teléfonos
• Guatemala	Centro de Información Toxicológica	(502) 2230-0807
	Centro de Intoxicaciones	(502) 2232-0735
• El Salvador	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262
• Honduras	Hospital Escuela	(504) 2232-2322
• Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 ext.: 1294
		(505) 8755-0938
• Costa Rica	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones	(506) 2223-1028
• Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	(507) 523-4948
		(507) 523-4968

Distribuido por:

DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S.A.

Dirección: Complejo Mandofer, Tegucigalpa, Honduras.

Teléfono: (+504) 2221-0857

Email: info@delcamposoluciones.com



 Anasac Centroamerica y Caribe  www.anasac.com/internacional



La información aquí entregada es de carácter referencial. La información oficial está contenida en la etiqueta del producto.



El titán que protege tus cultivos



Poderoso controlador de larvas de lepidóptero.

Su ingrediente activo Clorantraniliprole, posee un nuevo modo de acción, de gran selectividad con los enemigos naturales y especificidad en el control de larvas de lepidópteros.




 Anasac Centroamerica y Caribe  www.anasac.com/internacional

URANO 20 SC es un potente insecticida perteneciente al grupo de las diamidas antranílicas, altamente efectivo para el control de una gran variedad de larvas de lepidópteros y gran selectividad a enemigos naturales.

Atributos

- Poderoso control sobre las principales larvas de polillas que afectan el cultivo del melón, tomate, sandía y otros.
- Las larvas neonatas mueren rápidamente.
- Paraliza las larvas de forma inmediata.
- Tolerante al lavado por lluvias.
- Bajo impacto en insectos benéficos.
- Excelente perfil medio-ambiental.
- Excelente herramienta para el manejo integrado de plagas.



Perfil

Ingrediente activo	Clorantraniliprole
Grupo químico	Diamidas antranílicas
Concentración	200 g/Litro
Formulación	SC (Suspensión concentrada)
Modo de acción	Contacto e ingestión

Espectro de control



Control de lepidópteros



Protección cultivos
Melón (*Cucumis melo*)




Control de larva Spodoptera



Protección cultivos
Okra (*Abelmoschus esculentus*)

Modo de acción

Después de ingerir o entrar en contacto con el producto, las larvas quedan paralizadas de forma inmediata, dejan de alimentarse y mueren por inanición en 1 a 3 días, evitando el daño al cultivo.



Mecanismo de acción

Clorantraniliprole se une al receptor de rianodina (RyR) activando la liberación descontrolada de Ca²⁺ seguido de un agotamiento de las reservas internas del catión. Se produce una rápida parálisis muscular, un rápido cese de la alimentación y finalmente las larvas mueren entre 24 a 72 hrs.

Recomendaciones de uso



Cultivo	Plaga	Dosis
Maíz (<i>Zea mays</i>)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>) Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	0.075 - 0.25 L/ha
Tomate (<i>Lycopersicum esculentum</i>)	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	0.15 - 0.20 L/ha
Okra (<i>Abelmoschus esculentus</i>)	Minador de la hoja (<i>Liriomyza sp</i>)	0.10 - 0.125 L/ha
Pepino (<i>Cucumis savitus</i>)	Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	
Melón (<i>Cucumis melo</i>)	Gusano perforador de la guía y gusano del fruto (<i>Diaphania nitidalis</i>) (<i>Diaphania hyalinata</i>)	
Sandía (<i>Citrullus lanatus</i>)	Gusano falso medidor (<i>Trichoplusia ni</i>)	
Tabaco (<i>Nicotiana tabacum</i>)	Gusano del pepino (<i>Diaphania sp</i>)	

Aplicación foliar con un máximo de dos veces por ciclo de cultivo, con intervalo de 15 días.
Presentaciones disponibles: 200 ml y 1 Litro.