

VENCHITORE 24.7 SC

TIAMETOXAM + LAMBDA CIHALOTRINA 24.7 SC

VENCHITORE 24.7 SC Este producto es sistémico y translaminar que actúa por contacto e ingestión. Su mecanismo de acción se basa en la acción combinada de ambos principios activos: Lambda-cihalotrina altera la transmisión del impulso nervioso que mantiene abiertos los canales de sodio e imita la acción de la acetilcolina. Esto afecta la propagación de potenciales de acción a lo largo de los axones nerviosos dentro de las células, causando una hiperexcitación y en algunos casos bloqueo nervioso. Tiametoxam bloquea de forma irreversible las señales que son inducidas por la acetilcolina en la membrana postsináptica, interrumpiendo la transmisión de los impulsos entre las células nerviosas. Todo esto provoca parálisis y muerte del insecto.

CULTIVOS Y PRESENTACIONES COMERCIALES:

- **Bolivia:** Soya
 - Envase: 100ML, 250ML, 500ML, 1L, 5L, 10L, 20L, 25L
- **Ecuador:** Tomate
 - Envase: 100ML, 250ML, 500ML, 1L, 5L, 10L, 20L, 25L, 200L
- **Perú:** Arroz, Palto, Soya, Tomate
 - Envase: 100ML, 250ML, 500ML, 1L, 5L, 10L, 20L, 25L
- **Guatemala:** Ají, Arroz, Berenjena, Calabaza, Caña de azúcar, Chayotera, Maíz, Melón, Papa, Pepino, Sandía, Sorgo, Tabaco, Tomate
 - Envase: 100ML, 250ML, 500ML, 1L, 5L, 10L, 20L, 25L, 200L
- **El Salvador:** Maíz, Pepino, Sandía, Tabaco
 - Envase: 100ML, 250ML, 500ML, 1L, 5L, 10L, 20L, 25L
- **Honduras:** Arroz, Maíz, Melón, Papa, Pepino, Sandía, Tabaco, Tomate
 - Envase: 100ML, 250ML, 500ML, 1L, 5L, 10L, 20L, 25L
- **Nicaragua:** Arroz, Chile, Frijol, Maíz, Papa, Pastos, Tomate
 - Envase: 100ML, 250ML, 500ML, 1L, 5L, 10L, 20L, 25L
- **República Dominicana:** Aguacate, Ají, Arroz, Berenjena, Calabaza, Caña de azúcar, Chayotera, Maíz, Melón, Papa, Pepino, Sandía, Sorgo, Tabaco, Tomate
 - Envase: 100ML, 250ML, 500ML, 1L, 5L, 10L, 20L, 25L

ECUADOR

Cultivo	Plaga	Dosis
Tomate (<i>Lycopersicum esculentum</i>)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.30 l/ha

BOLIVIA

Cultivo	Plaga	Dosis
Soya (<i>Glycine max</i> L.)	Chinche arriga verde (<i>Dichelops furcatus</i>)	0.25 - 0.3 L/ha (volumen de mezcla de 200 L/ha)

PERÚ

Cultivo	Plaga	Dosis
PALTO (<i>Persea americana</i>)	"Thrips" (<i>Thrips tabaci</i>)	0.375-0.50 L/ha (volumen de mezcla de 1000 litros/ha)
TOMATE (<i>Solanum lycopersicum</i>)	"Mosca blanca" (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0.3 L/ha (volumen de mezcla de 400 litros/ha)
SOYA (<i>Glycine max</i>)	"Chinche barriga verde" (<i>Dichelops furcatus</i>)	0.3 L/ha (volumen de mezcla de 200 litros/ha)
ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)	"Gusano cogollero" (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.1 L/ha (volumen de mezcla de 200 litros/ha)

REPÚBLICA DOMINICANA

Cultivo	Plaga	Dosis
Maíz (<i>Zea mays</i>) Arroz (<i>Oryza sativa</i>) Caña de azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>) Sorgo (<i>Sorghum</i> spp.)	Oruga cortadora (<i>Agrotis bilitura</i>) Gusano elotero (<i>Helicoverpa zea</i>) Oruga defoliadora de gramíneas (<i>Mythimna unipuncta</i>) Palomilla del maíz (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0,15-0,20 L/ha (0,105-0,140 L/mz) y solución final de 300 L/ha (210 L/mz)
Pepino (<i>Cucumis sativus</i>) Sandía (<i>Citrullus lanatus</i>) Melón (<i>Cucumis melo</i>) Chayotera (<i>Sechium edule</i>) Calabaza (<i>Cucurbita</i> spp.)	Pulgón de los melones (<i>Aphis gossypii</i>) Tortuguilla (<i>Diabrotica balteata</i>) Minadores de las hojas (<i>Agromyza</i> sp. y <i>Liriomyza</i> sp.) Mosca blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Pulgón verde (<i>Myzus persicae</i>) Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)	0,10-0,20 L/ha (0,070-0,140 L/mz). El volumen de mezcla es 250 L/ha (175 L/mz) excepto para pepino que es 300 L/ha (210 L/mz)

EL SALVADOR Y HONDURAS (I)

Cultivo	Plaga	Dosis y época de aplicación
Maíz <i>Zea mays</i>	Oruga cortadora <i>Agrotis bilitura</i> Gusano elotero <i>Helicoverpa zea</i> Oruga defoliadora de gramíneas <i>Mythimna unipuncta</i> Palomilla del maíz <i>Spodoptera frugiperda</i>	0,15-0,20 L/ha (0,105-0,140 L/mz)
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	Cachazudo <i>Agrotis subterranea</i> Cogollero del tabaco <i>Heliothis virescens</i> Primavera del tabaco <i>Manduca sexta</i> Pulgón verde <i>Myzus persicae</i> Polilla de la papa <i>Phthorimaea operculella</i>	Volumen de caldo: 300 L/ha (210 L/mz) Momento de aplicación: al observar los primeros ejemplares.
Pepino <i>Cucumis sativus</i>	Pulgón de los melones <i>Aphis gossypii</i> Tortuguilla <i>Diabrotica balteata</i> Minadores de las hojas <i>Agromyza</i> sp. y <i>Liriomyza</i> sp.	0,10-0,20 L/ha (0,070-0,140 L/mz) Volumen de caldo: 300 L/ha (210 L/mz) Momento de aplicación: al observar los primeros ejemplares.
Sandía <i>Citrullus lanatus</i>	Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i> Pulgón verde <i>Myzus persicae</i> Gusano soldado <i>Spodoptera exigua</i>	0,10-0,20 L/ha (0,070-0,140 L/mz) Volumen de caldo: 250 L/ha (175 L/mz) Momento de aplicación:

HONDURAS (II)

Cultivo	Plaga	Dosis y época de aplicación
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Oruga cortadora <i>Agrotis bilitura</i> Gusano elotero <i>Helicoverpa zea</i> Oruga defoliadora de gramíneas <i>Mythimna unipuncta</i> Palomilla del maíz	0,15-0,20 L/ha (0,105-0,140 L/mz)
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i> Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Cachazudo <i>Agrotis subterranea</i> Cogollero del tabaco <i>Heliothis virescens</i> Primavera del tabaco <i>Manduca sexta</i> Pulgón verde <i>Myzus persicae</i> Polilla de la papa	Volumen de caldo: 300 L/ha (210 L/mz) Momento de aplicación: al observar los primeros ejemplares
Melón <i>Cucumis melo</i>	Pulgón de los melones <i>Aphis gossypii</i> Tortuguilla <i>Diabrotica balteata</i> Minadores de las hojas <i>Agromyza</i> sp. y <i>Liriomyza</i> sp. Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i> Pulgón verde <i>Myzus persicae</i> Gusano soldado <i>Spodoptera exigua</i>	0,10-0,20 L/ha (0,070-0,140 L/mz) Volumen de caldo: 250 L/ha (175 L/mz) Momento de aplicación: al observar los primeros ejemplares.

GUATEMALA

Cultivo	Plaga	Dosis y época de aplicación
Maíz <i>(Zea mays)</i> Arroz <i>(Oryza sativa)</i> Caña de azúcar <i>(Saccharum officinarum)</i> Sorgo <i>(Sorghum spp.)</i>	Gusano elotero <i>(Helicoverpa zea)</i> Oruga defoliadora de gramíneas <i>(Mythimna unipuncta)</i> Palomilla del maíz <i>(Spodoptera frugiperda)</i>	0,15-0,20 L/ha (0,105-0,140 L/mz) y solución final de 300 L/ha (210 L/ mz)
Pepino <i>(Cucumis sativus)</i> Sandía <i>(Citrullus lanatus)</i> Melón <i>(Cucumis melo)</i> Chayotera <i>(Sechium edule)</i> Calabaza <i>(Cucurbita spp.)</i>	Pulgón de los melones <i>(Aphis gossypii)</i> Tortuguilla <i>(Diabrotica balteata)</i> Minadores de las hojas <i>(Agromyza sp. y Liriomyza sp.)</i> Mosca blanca <i>(Bemisia tabaci)</i> Pulgón verde <i>(Myzus persicae)</i> Gusano soldado <i>(Spodoptera exigua)</i>	0,10-0,20 L/ha (0,070-0,140 L/mz) y solución final de 300 L/ha (210 L/ mz) 0,10-0,20 L/ha (0,070-0,140 L/mz) y la solución final de 250 L/ha (175 L/mz)

NICARAGUA

Cultivo	Plaga	Dosis
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i>	
Chile <i>Capsicum annum</i>	Gusano defoliador <i>Spodoptera sp.</i>	0.14 – 0.15 L/ha (0.098-0.105 L/mz)
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Chicharrita <i>Empoasca sp.</i>	Volumen de caldo: 300 L/ha (210 L/mz)
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	Tortuguilla <i>Diabrotica sp.</i>	Momento de aplicación: al observar los primeros ejemplares.
Arroz <i>Oryza sativa</i>		
Maíz <i>Zea mays</i>	Chinche <i>Oebalus sp.</i>	

CONTACTO ZELLAG

 +34 96 186 21 20
 info@zellag.com
 Marines, Valencia (España)

 +41 61 534 71 30
 info@zellag.com
 4125 Riehen (Switzerland)

2021 © Zellag AG. Todos los derechos reservados.

Exención de responsabilidad: La información contenida en este documento es a título comercial y orientativo. Solicite la ficha técnica de su país para una información precisa de uso, manipulación y aplicación. Zellag AG no se responsabiliza de ningún daño causado por el uso de la información contenida en este documento.

ZELL CHEMIE INTERNACIONAL, marca registrada. Documento y versión: **FTC-VENCHITORE 24.7 SC V.22.1**

www.zellag.com