

VITAFLO 10-8-7®

FERTILIZANTE FOLIAR QUELATADO

1. COMPUESTO:

VITAFLO 10-8-7, es un fertilizante completo en formulación líquida conteniendo nutrientes primarios, secundarios y micro nutrientes con Ácido Carboxílico (**Togo**) y Ácidos Húmicos.

2. COMPOSICIÓN:

ELEMENTO	% p/v	ELEMENTO	% p/v
Nitrogeno (N)	10.00	Manganeso (Mn) (10 ppm)	0.001
Fosforo (P ₂ O ₅)	8.00	Molibdeno (Mo)	0.70
Potasio (K ₂ O)	7.00	Zinc (Zn) (7 ppm)	0.0007
Azufre (S)	0.002	Acidos Carboxilicos	2.50
Calcio (CaO)	0.002	Fitohormonas	0.005
Magnesio (MgO)	0.001	Acidos Humicos	0.50
Boro (B) (2 ppm)	0.0002	Aminoacidos	4.00
Cobre (Cu) (5 ppm)	0.0005	Vitaminas (60 ppm)	0.006
Hierro (Fe) (10 ppm)	0.001		

3. ACCIÓN BIOLÓGICA:

Suministra a la planta todos los requerimientos de elementos mayores y menores que ésta necesita para un desarrollo balanceado. El contenido de Ácido Carboxílico (Togo) y Acido Húmico estimula el crecimiento y la movilización de nutrientes dentro de la planta.

4. APLICACIÓN Y COMPATIBILIDAD:

Se aplica con cualquier equipo de aspersión convencional o en sistemas de riego por goteo. Es totalmente compatible con los fitosanitarios de uso común en los cultivos en que se recomienda.

5. DOSIS Y CULTIVOS RECOMENDADOS:

Preparación de la mezcla:

Llenar con agua hasta la mitad de un tanque de aplicación (capacidad 200 litros). Diluir el contenido de este producto y luego completar con agua.

Forma de aplicación: Foliar y al suelo.

CULTIVOS	NOMBRE CIENTIFICO	DOSIS L/Mz	DOSIS L/Ha	EPOCA DE APLICACIÓN
Café	<i>Coffea arabica</i>	1.0 – 1.2	1.4 – 1.7	Después de floración y llenado de grano.
Tabaco	<i>Nicotiana tabacum</i>	1.0 – 1.2	1.4 – 1.7	Cuatro aplicaciones en el ciclo 15, 22, 30, 40 días después de germinación.
Tomate	<i>Solanum lycopersicum</i>	1.0 – 1.2	1.4 – 1.7	Antes de floración - después de floración y fructificación.
Papa	<i>Solanum tuberosum</i>	1.0 – 1.2	1.4 – 1.7	Tres aplicaciones en el ciclo 20,35 y 45 días después de germinación.
Maiz	<i>Zea mays</i>	1.0 – 1.2	1.4 – 1.7	Antes - después de floración y llenado de vainas.
Arroz	<i>Oryza sativa</i>	1.0 – 1.2	1.4 – 1.7	Durante el macollamiento, embuchamiento y llenado de grano.
Frijol	<i>Phaseolus vulgaris</i>	1.0 – 1.2	1.4 – 1.7	Antes - durante - después de floración.
Cebolla	<i>Allium cepa</i>	1.0 – 1.2	1.4 – 1.7	Tres aplicaciones en el ciclo 20, 35 y 45 días después de germinación.
Sandía	<i>Citrullus lanatus</i>	1.0 – 1.2	1.4 – 1.7	Cuatro aplicaciones en el ciclo 20, 35, 45 y 60 días después de germinación.
Melón	<i>Cucumis melo</i>	1.0 – 1.2	1.4 – 1.7	Cuatro aplicaciones en el ciclo 20, 35, 45 y 60 días después de germinación.
Crucíferas	<i>Brassica sp</i>	1.0 – 1.2	1.4 – 1.7	Tres aplicaciones en el ciclo 20, 35 y 45 días después de germinación.
Chile	<i>Capsicum annuum</i>	1.0 – 1.2	1.4 – 1.7	Inicio de formación de fruto hasta maduración.
Okra	<i>Abelmoschus esculentus</i>	1.0 – 1.2	1.4 – 1.7	Realizar aplicaciones cada 3 semanas después de trasplante.